

Umkehrfunktionen von Potenzfunktionen

Die Potenzfunktionen sind nicht immer auf der ganzen Definitionsmenge umkehrbar. Teilweise muss daher eine Aufteilung der Definitionsmenge vorgenommen werden.

Aufgabe 1


$$y = f(x) = 2(x + 4)^{-0.5} + 2 \quad D_f =]-4, \rightarrow[\quad W_f =]2, \rightarrow[$$

f ist auf ganz D_f injektiv (1-1-deutig); eine Aufteilung ist also nicht nötig.

$$\begin{aligned} \text{für } f^{-1}: \quad x &= 2(y + 4)^{-0.5} + 2 \\ 0.5(x - 2) &= (y + 4)^{-0.5} \\ y + 4 &= 4(x - 2)^{-2} \end{aligned}$$

$$y = f^{-1}(x) = -4 + 4(x - 2)^{-2} \quad D_{f^{-1}} = W_f, \quad W_{f^{-1}} = D_f$$

Bem.: Die Definitionsmenge von f^{-1} ist also im Vergleich zur maximal möglichen eingeschränkt. Würde man die Funktion $y = g(x) = -4 + 4(x - 2)^{-2}$ vorgeben, so wäre $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$



Aufgabe 2

$$y = f(x) = 0.5(x - 4)^3 - 1$$

$$D_f = W_f = \mathbb{R}$$

Obwohl die Funktion f hier injektiv ist, schränken wir aus Gründen der Definition der Wurzelfunktionen die Definitionsmenge ein:

$$D_{f_1} =] \leftarrow, 4] \quad , \quad W_{f_1} =] \leftarrow, -1]$$

$$D_{f_2} = [4, \rightarrow [\quad , \quad W_{f_2} = [-1, \rightarrow [$$

für f^{-1} :

$$x = 0.5(y - 4)^3 - 1$$

$$2(x + 1) = (y - 4)^3$$

$$y = f_1^{-1}(x) = 4 - \sqrt[3]{-2(x + 1)}$$

$$y = f_2^{-1}(x) = 4 + \sqrt[3]{2(x + 1)}$$

$$D_{f_1^{-1}} = W_{f_1} \quad , \quad W_{f_1^{-1}} = D_{f_1}$$

$$D_{f_2^{-1}} = W_{f_2} \quad , \quad W_{f_2^{-1}} = D_{f_2}$$

