

**Lösung der Aufgabe 1**

a)  $f'(x) = \frac{1}{6}x^2 - 2x + \frac{9}{2}$

$f''(x) = \frac{1}{3}x - 2$

Nullstellen :  $\frac{1}{18}x \cdot (x^2 - 18x + 81) = \frac{1}{18}(x - 9)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 0$  (doppelte Nullstelle)

Horizontale Tangenten :  $\frac{1}{6}(x^2 - 12x + 27) = \frac{1}{6}(x-3)(x-9) = 0$

$f''(3) = -1 < 0$ , Hochpunkt H(3|6)       $f''(9) = 1 > 0$       Tiefpunkt T(9|0)

$f''(x) = 0$  für  $x = 6$ ,  $f'''(6) = \frac{1}{3} \neq 0$

Wendepunkt W(6|3)

b) Wendetangente t

Steigung  $m_t = f'(6) = -\frac{3}{2}$

t :  $y = -\frac{3}{2}x + q_t$

Durch W :  $6 = -\frac{3}{2} \cdot 6 + q_t$

$\Rightarrow q_t = 12$

t :  $y = -\frac{3}{2}x + 12$


Dreiecksfläche  $\Delta OWQ$  :

$A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 12 = 36$

Fläche des Parabelsegments :

$F = \int_0^6 f(x)dx - F_{\Delta OPW} =$

$= \int_0^6 \left( \frac{1}{18}x^3 - x^2 + \frac{9}{2}x \right) dx - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = \left[ \frac{1}{72}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{9}{4}x^2 \right]_0^6 - 9 =$   
 $= 18 - 72 + 81 - 9 = 18 = \frac{1}{2}A$



c) Normale n zur Kurve im Wendepunkt :  $m_n = -\frac{1}{m_t} = \frac{2}{3}$

$n : y = \frac{2}{3}x + q_n$  durch W(6|3) :  $q_n = -1$ . Die Breite des Rechtecks ist 1, der Umfang 14.


### Lösung der Aufgabe 2

$$a) \quad f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2} = 1 + \frac{2}{x^2} \quad f'(x) = -\frac{4}{x^3} \quad f''(x) = \frac{12}{x^4}$$

f hat keine Nullstellen.

Asymptoten sind die Geraden  $y = 1$  (horizontal)  
und  $x = 0$  (vertikal, Polstelle)

Der Graph ist symmetrisch zur y-Achse.



$$b) \quad A(b) = \int_1^b \left(1 + \frac{2}{x^2}\right) dx = \left[ x - \frac{2}{x} \right]_1^b = b - \frac{2}{b} + 1 \quad \text{Der Grenzwert } \lim_{x \rightarrow \infty} A(b) \text{ existiert nicht.}$$

$$c) \quad \text{Tangente } t: y = mx + q \quad \text{mit } m = -\frac{a}{4} \text{ durch den Punkt } \left(2 \mid 1 + \frac{a}{4}\right)$$

$$t: y = -\frac{a}{4}x + \frac{3a}{4} + 1 \quad \text{mit der Nullstelle } x_0 = \frac{4}{a} + 3$$

$$\text{Flächenfunktion } A(a) = \frac{1}{2} \cdot q \cdot x_0 = \frac{1}{8a} (4 + 3a)^2$$

$$\text{Extremalstellen: } A'(a) = \frac{9a^2 - 16}{8a^2} \quad A'(a) = 0 \text{ für } a = \frac{4}{3} \quad (a < 0)$$

$$d) \quad \text{Das Extremum ist ein Minimum, weil } A''(a) = \frac{4}{a^3} > 0 \text{ für } a > 0.$$

Dreiecksfläche  $A = 6$

### Lösung der Aufgabe 3

$$a) \quad \vec{AS} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ -14 \end{pmatrix}, \quad \text{Kugelradius } R = \frac{1}{2} \sqrt{64 + 64 + 196} = 9$$

$$\text{Mittelpunkt } \vec{r}_M = \vec{r}_A + \frac{1}{2} \vec{AS} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad M(3 \mid -2 \mid 1); \quad \text{Kugelgleichung } k: (x - 3)^2 + (y + 2)^2 + 2z = 81$$

$$b) \quad \text{Vektor normal zu } E: \vec{AB} \times \vec{BC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 12 \\ -12 \end{pmatrix} \propto \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ebene } E: x - 2y + 2z + D = 0. \quad A(-1 \mid -6 \mid 8) \in E: D = -27$$

$$E: x - 2y + 2z - 27 = 0$$

- c) Für den Winkel  $\varphi$  zwischen dem Normalenvektor und dem Vektor  $\vec{AS}$  gilt :

$$\cos \varphi = \frac{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}}{9 \cdot 3} = \frac{3 - 8 - 14}{27} \quad \varphi = 131^\circ 8'$$

Der Winkel zwischen der Ebene und der Geraden beträgt  $\gamma = \varphi - 90^\circ = 41^\circ 8'$

- d) Für den Inhalt G der Grundfläche ABC gilt :  $G = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{BC}| = \frac{1}{2} \sqrt{36 + 144 + 144} = 9$

Die Höhe h der Pyramide ist der Abstand des Punktes S von der Ebene E :  $x - 2y + 2z - 27 = 0$   
S(7 | 2 | -6) einsetzen in die HNF : es ergibt sich  $h = 12$

- e) Der gesuchte Kreismittelpunkt M' ist der Durchstosspunkt der Normalen durch M senkrecht zur Ebene E durch diese Ebene :

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ schneiden mit E : } 3 + t - 2 \cdot (-2 - 2t) + 2 \cdot (1 + 2t) - 27 = 0 \Rightarrow t = 2$$

$$M'(5 | -6 | 5). \text{ Der Kreisradius ist } r' = |M'A| = \left| \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} = 6.7\dots$$

#### Lösung der Aufgabe 4.1

a)  $P(X = 2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{5} \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{9}{10} = \frac{12+17+27}{1000} = \frac{56}{1000}$

b)  $P(X = 3) = \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{1}{10} = \frac{3}{1000}$

$$P(X = 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{9}{10} + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{9}{10} + \frac{4}{5} \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{1}{10} = \frac{153+108+68}{1000} = \frac{329}{1000}$$

$$P(X = 0) = \frac{4}{5} \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{9}{10} = \frac{612}{1000}$$

$$\text{Erwartungswert } E(X) = \frac{0 \cdot 612 + 1 \cdot 329 + 2 \cdot 56 + 3 \cdot 3}{1000} = \frac{45}{1000}$$

- c) Gegenereignis : Das Ziel wurde nicht verfehlt mit der Wahrscheinlichkeit  $P(T) = 1 - P(0) = \frac{388}{1000}$

$$P(B \text{ trifft}) = \frac{3}{20}, \quad P(B|T) = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{388}{1000}} = \frac{75}{194}$$

#### Lösung der Aufgabe 4.2

a) Gegenereignis :  $P(\text{nie Feld 13}) = \left(\frac{36}{37}\right)^{10} = 0.7603\dots$

$$P(\text{mindestens einmal Feld 13}) = 1 - 0.7603\dots = 0.2396\dots$$

- b)  $P(\text{mindestens einmal Feld 13 in } n \text{ Runden}) = 1 - P(\text{nie Feld 13 in } n \text{ Runden}) = 1 - \left(\frac{36}{37}\right)^n > 0.9$   
 $n > 84.039$ , also  $n \geq 85$ .

c)  $P(\text{mindestens 3 mal}) = 1 - \binom{20}{2} \cdot \left(\frac{34}{37}\right)^{18} \cdot \left(\frac{3}{37}\right)^2 - \binom{20}{1} \cdot \left(\frac{34}{37}\right)^{19} \cdot \frac{3}{37} - \binom{20}{0} \cdot \left(\frac{34}{37}\right)^{20}$   
 $\approx 1 - 0.2726 - 0.3252 - 0.1843 = 0.2178$

**Lösung der Aufgabe 5.1**

a)  $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ , also  $\gamma = 54.1^\circ$

Sinussatz :  $\overline{AC} = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} \cdot \overline{AB} = 505.61\dots$  Die Turmhöhe beträgt  $h = \overline{AC} \cdot \tan \delta = 54.93\dots$

Die Turmhöhe beträgt etwa 54.9 m.

b) Der Schall legt in 1.00 Sekunden die Strecke  $\overline{FT} = 344$  m zurück.

Pythagoras :  $\overline{CF} = \sqrt{\overline{FT}^2 - h^2} = 339.59\dots$

Nach dem Kosinussatz im Dreieck ACF folgt :  $\overline{FA}^2 = \overline{CF}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \cdot \overline{CF} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \gamma$

$\overline{FA} = 411.83\dots$

Das Schiff war etwa 340 m von C entfernt und 412 m von A.

**Lösung der Aufgabe 5.2**

a) Schnittpunkt :  $2 \sin^2 x = 3 \cos x$  ergibt die quadratische Gleichung  $2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0$  mit der Lösung  $\cos x = -\frac{1}{2}$  (zweite Lösung  $\cos x = -2$ ).


Die Koordinaten des Schnittpunktes sind  $S(\frac{\pi}{3} | \frac{3}{2})$

Schnittwinkel :

$f'(x) = 4 \sin x \cos x$ ,  $f'(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$ . Der Steigungswinkel beträgt  $60^\circ$ .

$g'(x) = -3 \sin x$ ,  $g'(\frac{\pi}{3}) = -\frac{3}{2}\sqrt{3}$ . Der Steigungswinkel beträgt  $-68.948\dots$

Der stumpfe Schnittwinkel ist  $128.9\dots$ , der spitze Schnittwinkel  $51.1\dots$



b) Der Inhalt der von den Graphen von f und g und der y-Achse eingeschlossenen Fläche beträgt :

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (3 \cos x - 2 \sin^2 x) dx = [3 \sin x - x + \sin x \cos x]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{7}{4} \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} = 1.98\dots$$