


Lösung der Aufgabe 1



a) $\rho(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{\pi} \geq 0$

$\int_0^2 \rho(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} \right]_0^2 =$ (Formelsammlung)

$= \frac{1}{\pi} \cdot (0 + 2 \arcsin 1 - 0 - 2 \cdot 0) = 1$

b) $P(X \geq 1) = \int_1^2 \rho(x) dx \approx 0.391$ TI 83

c) $E(X) = \int_0^2 x \cdot \rho(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^2 x \sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{2\pi} \int_0^2 (-2x) \cdot (4-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx =$

$= -\frac{1}{2\pi} \left[\frac{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = -\frac{1}{3\pi} \left[0 - 4^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{8}{3\pi} \approx 0.85$

d) $P(1.5 \leq X_1 \leq 1.6 | X_1 \geq 1) = \frac{\int_{1.5}^{1.6} \rho(x) dx}{\int_1^2 \rho(x) dx} \stackrel{\text{TI83}}{\approx} \frac{0.0402}{0.3910} \approx 0.103$

Lösung der Aufgabe 2

a) $y' = 9.81 - 0.015 y^2$

$h = 0.4$

$\Delta y = (9.81 - 0.015 y^2) \cdot h$

x	0	0.4	0.8	1.2
y	0	3.924	7.756	11.319
y'	9.81	9.5790	8.9078	
Δy	3.924	3.8316	3.5631	

b) $y = a \frac{e^{bx} - c}{e^{bx} + c}$

$y' = a \frac{be^{bx}(e^{bx} + c) - (e^{bx} - c)be^{bx}}{(e^{bx} + c)^2} = 2abc \frac{e^{bx}}{(e^{bx} + c)^2}$

Eingesetzt in die Differentialgleichung $y' = -ry^2 + g$:

$2abc \frac{e^{bx}}{(e^{bx} + c)^2} = -r \cdot a^2 \frac{(e^{bx} - c)^2}{(e^{bx} + c)^2} + g \quad | \cdot (e^{bx} + c)^2$

$2abc e^{bx} = -ra^2 e^{2bx} + 2ra^2 c e^{bx} - ra^2 c^2 + g e^{2bx} + 2gce^{bx} + gc^2$

$0 \equiv e^{2bx} \cdot (-ra^2 + g) + e^{bx} \cdot (2ra^2 c + 2gc - 2abc) + (-ra^2 c^2 + gc^2)$

Koeffizientenvergleich: $-ra^2 + g = 0 \Rightarrow a = \sqrt{\frac{g}{r}}$

$2ra^2 c + 2gc - 2abc = 0 \Rightarrow ab = ra^2 + g = 2g \Rightarrow b = \frac{2g}{a} = 2\sqrt{gr}$

$-ra^2 c^2 + gc^2 = 0 \quad \checkmark$

c) $y(0) = a \frac{1-c}{1+c} = 0 \Rightarrow c = 1$

d) $v(t) = a \frac{e^{bt} - c}{e^{bt} + c} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = a = \sqrt{\frac{g}{r}} = \sqrt{\frac{2gm_s}{c_w \rho_L A}} \approx 25.3 \frac{m}{s}$

(auch aus $\dot{v} = 0$ und der Differentialgleichung)

Lösung der Aufgabe 3

a) $w = z^2 - 1 + 3i$

Fixpunkte


$z = z^2 - 1 + 3i$

$(z - \frac{1}{2})^2 = 1 - 3i + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} - 3i$

$= \sqrt{\frac{25}{16} + 9} \arctan \frac{-3}{\frac{5}{4}} = \frac{13}{4} \text{cis}(-67.38\dots)$

$z_{1,2} - \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{13}}{2} \text{cis} 33.69\dots = \pm (\frac{3}{2} - i)$

$z_1 = 2 - i \quad z_2 = -1 + i$



b) $u + iv = (x + iy)^2 - 1 + 3i = x^2 + 2ixy - y^2 - 1 + 3i$

$u = x^2 - y^2 - 1$
 $v = 2xy + 3$

$g : y = x - 2$ in Parameterform $x = t$
 $y = t - 2$

Bild : $u = t^2 - (t - 2)^2 - 1 = 4t - 5 \Rightarrow t = \frac{u+5}{4}$

$v = 2t(t - 2) + 3 = 2t^2 - 4t + 3 = 2\left(\frac{u+5}{4}\right)^2 - 4\frac{u+5}{4} + 3 = \frac{u^2}{8} + \frac{u}{4} - 2 + \frac{50}{16}$

$v = \frac{1}{8}(u^2 + 2u + 9)$ Parabel, S(-1|1), Achse vertikal



c) nach Moivre $r = \rho^2, \psi = 2\varphi$

Umkehrabbildung $\rho = \sqrt{r}, \varphi = \frac{\psi}{2}$ existiert eindeutig, Abbildung bijektiv

$0 \leq \psi \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$


d) $v = \text{constant}$
 $v = 2xy$ Hyperbeläste

Skizze für $v = 1, v = 2, v = 3$



Lösung der Aufgabe 4

a)



b) Zustand 1 : $p = 800'000 \text{ Pa}$, $V_1 = 0.3 \text{ l} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$
 $T_1 = 310 \text{ K}$

$$p_1 V_1 = n R T_1 \quad \Rightarrow \quad n = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = 0.0932 \text{ mol}$$

c) iso bar : $p_2 = p_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \Rightarrow \quad T_2 = \frac{V_2}{V_1} \cdot T_1 = 827 \text{ K}$

d) $\Delta V = V_2 - V_1 = 0.5 \text{ l} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$

$$W_1 = p_1 \Delta V = 400 \text{ J}$$

$$Q_1 = C_p n \Delta T = 1400 \text{ J}$$

$$\left(\text{mit } C_p = 29.1 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}, \Delta T = T_2 - T_1 = 517 \text{ K} \right)$$

e) Wirkungsgrad : $\eta = \frac{W_{\text{netto}}}{Q_1} = \frac{W_1 - W_3}{Q_1}$
 isotherme Kompression (bei $T_1 = 310 \text{ K}$)

$$W_3 = n R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 235 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{W_1 - W_3}{Q_1} = 0.118 = 11.8 \%$$

Lösung der Aufgabe 5

$$\text{a) } z = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$|z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = 17.2 \Omega$$

$$\varphi = \arg(z) = -29.4^\circ$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{|z|} = 0.698 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } U(t) &= U_R + U_L + U_C = R I + L \dot{I} + \frac{Q}{C} \\ \text{mit } I &= \dot{Q} : \quad U(t) = R \dot{Q} + L \ddot{Q} + \frac{Q}{C} \\ \Rightarrow \quad \ddot{Q} &+ \frac{R}{L} \dot{Q} + \frac{1}{LC} Q = \hat{U} \cos \omega t \end{aligned}$$

Differentialgleichung der erzwungenen gedämpften Schwingung :

$$\ddot{y} + 2\delta \dot{y} + \omega_0 y = A \cos \omega_1 t$$

Resonanz bei $\omega = \omega_0$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 500 \text{ s}^{-1}$$

Lösung der Aufgabe 6

$$m_0 = 20'000 \text{ kg}, v = 0.95 c$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.95^2}} = 3.20$$

- a) Raumschiff : Bezugssystem S
 Raumstationen : Bezugssystem S'

$$\text{in S : } d = v \cdot t = 0.95 \text{ Ls} = 285'000 \text{ km}$$

$$\text{in S' : } d' = \gamma \cdot d \quad (d' : \text{“Eigenlänge”})$$

$$d' = 3.04 \text{ Ls} = 913'000 \text{ km}$$

$$\text{c) } t_B' = \frac{d'}{v} = 3.2 \text{ s} \quad (= \gamma \cdot t)$$

- d) in S : $t = 1 \text{ x}$ (Eigenzeit der Reise im Raumschiff)

Während dieser Zeit vergeht in den Raumstationen jedoch nur die Zeit

$$t' = \frac{t}{\gamma} = 0.313 \text{ s}, \text{ nicht } 3.2 \text{ s.}$$

Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, weil aus Sicht des Raumschiffes (S) die Uhren der Raumstationen nicht synchronisiert sind. Im System S zeigt die Uhr von B bereits die Zeit 2.887 s an, wenn das Raumschiff an A vorbeifliegt.

\Rightarrow Beim Vorbeiflug zeigt B die Zeit 3.2 s an, obwohl nur 0.313 s vergangen sind.

$$\text{e) } E_k = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1) m_0 c^2 = 3.96 \cdot 10^{21} \text{ J}$$